



МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
ПЕСТИЦИДА ИЛИ АГРОХИМИКАТА

№ 4936 от « 30 » июня 2025 г.

Настоящее свидетельство выдано
АО «ФМРус», ОГРН 1097746208207

(наименование Регистранта, ОГРН, ФИО индивидуального предпринимателя, ОГРНИП)

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ

«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»
пестицид Фанфан, КЭ (250 г/л ципроконазола)

(наименование пестицида или агрохимиката)

050-02-4936-1

получил государственную регистрацию за №

29

июня

2035

на срок по « » г. и допускается к обороту на

территории Российской Федерации со следующими регламентами применения:

Директор Департамента растениеводства, механизации,
химизации и защиты растений Р.В. Некрасов



(подпись)

М. П.



№ 005499

Для сельскохозяйственного производства:

Норма расхода пестицида, л/га	Культура	Вредный объект	Способ, время обработки, особенности применения пестицида	Срок ожидания (кратность обработок)
1	2	3	4	5
0,2 – 0,4	Пшеница	Ржавчина (желтая, бурая, стеблевая), мучнистая роса, септориоз, фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков заболевания. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	50(1)
0,25-0,4	Свёкла сахарная	Церкоспороз, мучнистая роса, фомоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – при появлении первых признаков заболевания, второе – через 10-14 дней (при необходимости). Расход рабочей жидкости – 200- 300 л/га	20(1-2)
0,2 – 0,4	Соя	Церкоспороз, септориоз, антракноз	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков заболевания. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га	40(1)

Запрещается применение препарата: авиационным методом, в водоохранной зоне водных объектов и в личном подсобном хозяйстве.

Срок безопасного выхода людей на обработанные препаратом площади для проведения механизированных работ - 3 дня.

