

# Бифактор, КЭ



450 г/л синтетического латекса



Срок годности 3 года  
от 0 до +25 °С

**Клей на основе синтетического латекса  
для предотвращения растрескивания  
стручков рапса и бобов гороха**



- ◆ Предотвращает потери семян рапса, сурепицы, гороха при созревании и уборке
- ◆ Позволяет провести уборку прямым комбайнированием
- ◆ Способствует естественному созреванию семян
- ◆ Прекрасно совмещается с десикантами и повышает их эффективность
- ◆ Долго сохраняется на поверхности растения, предотвращая растрескивание стручков
- ◆ Может применяться в любое время суток

### Механизм действия

При попадании рабочего раствора препарата на обрабатываемые растения, сразу после высыхания Бифактор создаёт на их поверхности полимерную латексную пленку. Пленка позволяет испаряться воде с поверхности растения, но не пропускает воду обратно.

### Рекомендации по применению

Бифактор следует применять в следующие сроки.

**Рапс** — за 3 недели до уборки, стручки ещё зелёные. Стручок можно согнуть в виде буквы V без растрескивания. Цвет семян коричневый или частично жёлтый в стручках верхней части растения.

Оптимальные результаты достигаются при применении с десикантом Бифактор 1 л/га + Буцефал 0,1 л/га — за 3 недели до уборки.

**Горох** — за 2 недели до уборки.

Культура	Норма расхода, л/га	Способ применения
Рапс, сурепица, горох	0,8–1,0	За 2–4 недели до уборки урожая. Норма расхода рабочего раствора 100–300 л/га.