Схема защиты зерновых культур

стадия развития (код ВВСН)		12–13	21	25	29	30	31	32	37	51–59	61–69	85–86	92	
спектр действия	**до посева**	**2–3-й лист**	**начало кущения**	**середина кущения**	**конец кущения**	**выход в трубку**	**1-е междоузлие**	**2-е междоузлие**	**флаг-лист**	**колошение**	**цветение**	**восковая спелость**	**полная спелость**	**хранение**
виды головни, в т.ч. твердая, пыльная, каменная и др., корневые гнили, плесневение семян	Дерозал Евро, КС Стингер, КС Стингер Трио КС ТИР, ТПС ТМТД, ТПС Факир, КС													
хлебная жужелица, злаковые мухи, проволочники и др.	Имидалит, ТПС Тиамакс, КС													
все двудольные и злаковые сорняки	Кайман, ВР													
однолетние двудольные сорняки			Бентасил, ВР Диамисоль, ВР											
однолетние двудольные сорняки, в т.ч. устойчвые к 2,4-Д и 2М-4Х (подмаренник цепкий и др.) и некоторые многолетние двудольные корнеотпрысковые (осоты, бодяк)			Аврорекс, КЭ Аргамак, ВДГ Астэрикс, СЭ Буцефал, КЭ Ларт, ВР Тифи, ВДГ											
однолетние и многолетние двудольные сорняки, в т.ч. виды ромашки, горца, бодяка, осота, латука, вьюнок			Клорит, ВР Эндимион, КЭ											
однолетние злаковые сорняки		Смилодон, КЭ Формуляр, КЭ												
клоп вредная черепашка, пьявица, внутристеблевые мухи, тли, трипсы, блошки, хлебные жуки		Альфашанс, КЭ Клонрин, КЭ Таран, ВЭ Циперус, КЭ		Тиамакс, КС										
ржавчина бурая, фузариоз колоса, желтая, стеблевая, мучнистая роса, септориоз листьев и колоса, пиренофороз, пятнистости темно-бурая, сетчатая, полосатая, ржавчина карликовая, ринхоспориоз				Альпари, КЭ Дерозал Евро, КС ТриЗаРа Супер, КЭ Фанфан, КЭ Экселент, КС			Тебумет, КС							
десикация													Буцефал, КЭ Молоток, ВР	
вредители хлебных запасов														Прокроп, КЭ