



МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ
СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
ПЕСТИЦИДА ИЛИ АГРОХИМИКАТА

№ 4461 от « 25 » марта 2024 г.

Настоящее свидетельство выдано

АО «ФМРус», ОГРН 1097746208207;

ООО «Агрохиминвест», ОГРН 1027743011207

(наименование Регистранта, ОГРН, ФИО индивидуального предпринимателя, ОГРНИП)

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ

«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»

пестицид Альфашанс, КЭ (100 г/л альфа-циперметрина)

(наименование пестицида или агрохимиката)

получил государственную регистрацию за № 050(360)-01-4461-1
на срок по « 24 » марта 2034 г. и допускается к обороту на

территории Российской Федерации со следующими регламентами применения:

Директор Департамента растениеводства, механизации,
химизации и защиты растений Р.В. Некрасов



М. П.



№005005

Для сельскохозяйственного производства:

Норма применения пестицида, (л/га)	Культура	Вредный объект	Способ, сроки и особенности применения	Срок ожидания (кратность обработок)
1	2	3	4	5
0,1-0,15	Пшеница яровая и озимая	Клоп вредная черепашка	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200- 400 л/га	20(2)
0,1		Трипсы, цикадки, пьявицы		
		Хлебные блошки	Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости - 100-200 л/га	
		Ячмень яровой и озимый	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200- 400 л/га	
		Свекла сахарная		
0,07-0,1	Картофель	Колорадский жук	Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости – 100 - 200 л/га	
0,1-0,15	Рапс, горчица (кроме горчицы на масло)	Рапсовый цветоед		
		Крестоцветные блошки	Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости – 100 - 200 л/га	
0,1	Горох	Гороховая зерновка, гороховая плодожорка, гороховая тля	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200- 400 л/га	20(1)
0,3	Пастбища, участки, заселенные саранчовыми, дикая растительность	Саранчовые	Опрыскивание в период массового отрождения личинок. Срок возможного пребывания людей на обработанных площадях не ранее 3 дней после обработки. Сбор грибов и ягод после обработки дикой растительности в сезон обработки не допускается. Расход рабочей жидкости - 200 - 400 л/га	-(1)

Запрещается применение препарата: авиационным методом, в водоохранной зоне водных объектов, в личных подсобных хозяйствах.

Срок безопасного выхода людей на обработанные пестицидом площади для проведения механизированных работ – 3 дня.

