



МИНСЕЛЬХОЗ РОССИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
ПЕСТИЦИДА ИЛИ АГРОХИМИКАТА

№ 2968 от « 30 » декабря 2020 г.

Настоящее свидетельство выдано

АО «ФМРус», ОГРН 1097746208207

(наименование регистранта, ОГРН, ФИО индивидуального предпринимателя, ОГРНИП)

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1997 г. № 109-ФЗ

«О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами»

пестицид Буцефал, КЭ (480 г/л карфентразон-этила)

(наименование пестицида или агрохимиката)

получил государственную регистрацию за № 050-03(04)-2968-1

на срок по « 29 » декабря 2030 г. и допускается к обороту на

территории Российской Федерации со следующими регламентами применения:

Директор Департамента растениеводства, механизации,
химизации и защиты растений Р.В. Некрасов



М. П.



№003361

Для сельскохозяйственного производства в качестве гербицида:

Норма расхода препарата, л/га	Культура	Вредный объект	Способ, время, особенности применения	Срок ожидания (кратность обработок)
1	2	3	4	5
0,025-0,03	Пшеница яровая и озимая	Однолетние двудольные, в том числе <i>подмаренник цепкий</i> , и устойчивые к 2,4-Д сорняки	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. Озимые обрабатывать весной. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га	60(1)

Для сельскохозяйственного производства в качестве десиканта:

Норма расхода препарата, л/га	Культура	Вредный объект	Способ, время, особенности применения	Срок ожидания (кратность обработок)
1	2	3	4	5
0,1-0,125	Подсолнечник (на семена и масло)	Десикация	Опрыскивание посевов в начале естественного созревания при побурении 70-80% корзинок (при влажности семян 25-30%). Расход рабочей жидкости: при наземном опрыскивании – 250 л/га, при авиационном применении – 50-100 л/га	12(1)
0,1-0,125 (А)				
0,1-0,125	Рапс яровой и озимый		Опрыскивание посевов при побурении 70-75% стручков (при влажности семян 25-30%). Расход рабочей жидкости: при наземном опрыскивании – 250 л/га, при авиационном применении – 50-100 л/га	
0,1-0,125 (А)				
0,1-0,125	Картофель		Опрыскивание посадок в период формирования клубней и огрубления кожуры. Расход рабочей жидкости: при наземном опрыскивании – 400 л/га, при авиационном применении – 50-100 л/га	
0,1-0,125 (А)				

Срок безопасного выхода людей на обработанные препаратом площади для проведения механизированных работ – 3 дня.

Срок безопасного выхода людей на обработанные препаратом площади для проведения механизированной уборки подсолнечника, рапса и картофеля после десикации – 10 дней.

Запрещается применение препарата: в водоохранной зоне водных объектов, в личных подсобных хозяйствах.

